



FONDO EDITORIAL



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA
DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO

INVESTIGACIÓN REALIZADA EN UN CONTEXTO REGIONAL

**TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LOS CULTIVOS
ANDINOS, DISTRITOS PAMPAS, AHUAYCHA Y DANIEL HERNÁNDEZ,
PROVINCIA TAYACAJA, HUANCVELICA, PERÚ**



**CHARLES FRANK SALDAÑA CHAFLOQUE
MERCEDES ACOSTA ROMÁN**

**TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE
LOS CULTIVOS ANDINOS, DISTRITOS PAMPAS,
AHUAYCHA Y DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA
TAYACAJA, HUANCAVELICA, PERÚ, 2020**



La investigación, su esencia y arte.

Charles Frank Saldaña Chafloque

Mercedes Acosta Román

Pampas – Perú

2023

**TAXONOMÍA Y CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE
LOS CULTIVOS ANDINOS, DISTRITOS PAMPAS,
AHUAYCHA Y DANIEL HERNÁNDEZ, PROVINCIA
TAYACAJA, HUANCVELICA, PERÚ, 2020**

© Charles Frank Saldaña Chafloque

Email: charlessaldana@unat.edu.pe

Dirección: Urb. Manuel Arévalo II Etapa Mz.B30 Lote 26, La Esperanza, Trujillo - La Libertad

Mercedes Acosta Román

Email: mercedesacosta@unat.edu.pe

Dirección: Pasaje San Lucas N 139, urbanización chorrillos, Huancayo - Junín

Editada por:

© Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT) - Fondo Editorial.

Dirección: Bolognesi N° 416, Tayacaja, Huancavelica -Perú
info@unat.edu.pe

Telf: (+51) 67 -990847026

Web: <https://unat.edu.pe/>

Primera edición digital: Mayo 2023

Libro digital disponible en <https://fondoeditorial.unat.edu.pe>

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-04169

ISBN: 978-612-49231-9-7

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento información, la transmisión de ninguna otra forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.



EDICATORIA

*Al Dr. José Mostacero León, por su
incalculable aporte a la ciencia, en la búsqueda
del conocimiento a través del estudio de la
botánica.*

La investigación, su esencia y arte.

*A las Comunidades Andinas de Pampas,
Ahuaycha y Daniel Hernández, de la provincia
de Tayaaja, donde se realizó la investigación.*

RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia Tayacaja, región Huancavelica, Perú. Este estudio se utilizó la técnica de la entrevista del tipo Semi-estructurada. Se observó mayor variedad de cultivos andinos en el distrito Daniel Hernández, y menor variedad en los distritos de Pampas y Ahuaycha. El “maíz” *Zea mayz* y la “papa” *Solanum tuberosum*, son los cultivos andinos que se siembran en los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández. El bajo rendimiento de los cultivos andinos, es causada por la fragilidad de los sistemas andinos, como sus características biofísicas, topográficas, edáficas, siendo la principal causa el factor climático tales como precipitaciones, heladas y sequias, en especial la altura máxima en la cual se puede sembrar y obtener rendimientos aceptables. En los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, la alfalfa *Medicago sativa* fue el cultivo que obtuvo mayor rendimiento promedio 20 ton/ha y el olluco *Ullucus tuberosus* el menor rendimiento promedio con 1.30 ton/ha.

Palabras clave: taxonomía, clima, rendimiento, cultivos andinos.

ABSTRACT

The objective of this research work was to determine the taxonomy and agronomic characteristics of Andean crops, Pampas, Ahuaycha and Daniel Hernández districts, Tayacaja province, Huancavelica region, Peru. This study used the technique of the Semi-structured interview type. A greater variety of Andean crops was observed in the Daniel Hernández district, and less variety in the Pampas and Ahuaycha districts. The "corn" *Zea mays* and the "potato" *Solanum tuberosum*, are the Andean crops that are planted in the districts of Pampas, Ahuaycha and Daniel Hernández. The low yield of Andean crops is caused by the fragility of Andean systems, such as their biophysical, topographic, and edaphic characteristics, the main cause being the climatic factor such as rainfall, frost, and drought, especially the maximum height at which it can be sown and obtain acceptable yields. In the Pampas, Ahuaycha and Daniel Hernández districts, alfalfa *Medicago sativa* was the crop that obtained the highest average yield, 20 tons/ha, and olluco *Ullucus tuberosus*, the lowest average yield, with 1.30 tons/ha.

Keywords: taxonomy, climate, yield, andean crops.

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	iv
RESUMEN	v
ABSTRACT	vi
ÍNDICE DE CONTENIDO	vii
PRESENTACIÓN	ix
CAPÍTULO I:.....	11
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	11
1.1. Planteamiento del problema de investigación	12
1.1.1. Situación problemática	12
1.1.2. Formulación del problema.....	12
1.1.3. Justificación.....	13
1.1.4. Objetivos.....	14
1.1.5. Limitaciones	14
CAPÍTULO II:.....	16
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	16
2.1. Antecedentes del problema.....	17
2.2. Marco teórico.....	21
CAPÍTULO III:	29
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	29
3.1. Diseño metodológico.....	30
3.2. Procedimiento de muestreo.	31
3.3. Recolección y análisis de la información	32
3.4. Aspectos éticos y regulatorios.	33
CAPÍTULO IV:.....	34
RESULTADOS	34

4.1. Resultados finales	35
CAPÍTULO V:	48
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	48
5.1. Conclusiones.....	49
5.2. Recomendaciones	50
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	51
ANEXOS.....	57



La investigación, su esencia y arte.

PRESENTACIÓN

La región andina integrada por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia ha sido catalogada como una de las áreas del mundo con mayor riqueza vegetal y diversidad de cultivos con una importante colección de germoplasma relacionado con tres de los principales tubérculos de mayor consumo típico: oca (*Oxalis tuberosa*), mashua (*Tropaeolum tuberosum*) y melloco (*Ucullus tuberosus*). Los cultivos andinos se desarrollan en áreas consideradas por la agricultura moderna (principalmente enfocada en cultivos extensivos) como tierras marginales, incluso con reducida probabilidad de producir alimentos de calidad; sin embargo, la adaptación al medio hace posible el crecimiento de estos cultivos. La riqueza de estos cultivos en nutrientes y propiedades farmacológicas, así como su uso en medicina tradicional han sido descritos previamente. La explotación de cultivos extensivos por parte de grandes empresas, siendo económicamente más rentable producir y comercializar unas pocas especies vegetales como la papa, el arroz, la soja o el maíz, hacen que los cultivos andinos queden infrautilizados o en desuso, limitándose al consumo interno en determinadas zonas restringidas, por lo que el consumo reducido será cada día menor.

Los consumidores demandan cada vez, tanto materias primas como productos intermedios o finales con mejores y variadas características nutricionales percibidas como naturales y, si es posible, que contribuyan a su salud y bienestar. En este sentido, los tubérculos, rizomas y leguminosas de la región andina, por su alto valor nutritivo,

podrían jugar un papel importante en el desarrollo de productos alimenticios, incluso funcionales, además de cubrir la demanda de alimentos para personas con requerimientos especiales, como es el caso de los intolerantes o alérgicos al gluten, ya que algunos cultivos andinos no contienen gluten. Además, la promoción de la explotación de estos recursos sería de interés socioeconómico, favoreciendo la biodiversidad y el impacto y sostenibilidad de la región andina.

En la región andina se pueden encontrar desniveles de miles de metros dentro de las zonas más altas “altiplanos”, y más aún con las cercanas al nivel del mar; por lo tanto, las condiciones climáticas pueden ser muy diferentes; por lo tanto, las condiciones climáticas pueden ser muy diferentes e influyen en la taxonomía y características de los cultivos. En este sentido, la finalidad de esta investigación es conocer sobre la taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, de los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia Tayacaja, Huancavelica, Perú. *y arte.*

Los Autores



CAPÍTULO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación, su esencia y arte.

1.1. Planteamiento del problema de investigación

1.1.1. Situación problemática

Actualmente no se cuenta con información actualizada sobre la diversidad de cultivos andinos que se siembran en los Distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, de la Provincia de Tayacaja. Cabe mencionar que, en las comunidades andinas, su alimentación se basa en los tubérculos, leguminosas, consumo de granos andinos, ricos en nutrientes. Asimismo, los cultivos andinos que aún subsisten en nuestros territorios, gracias al celo con que han sido guardados por nuestras comunidades de indígenas y campesinos, vuelven a retomar la importancia que nunca debieron haber perdido, para en breve convertirse en elementos importantes de nuestra alimentación.

Con la presente investigación se lograría contribuir con la actualización de registros de especies de cultivos andinos y características agronómicas de los mencionados distritos.

1.1.2. Formulación del problema

¿Cuál es la taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos, distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú, 2020?

1.1.3. Justificación

La relación de la alimentación y la salud del ser humano, ha sido ampliamente fundamentada. El paso a seguir es generar actividad científica, con conciencia ética y equidad, para hacer de los alimentos los verdaderos gestores del bienestar físico y mental de los pueblos. Como se ha mencionado, los cultivos andinos constituyen una fuente de alimentación promisorio, con el beneficio que aportan los biocompuestos presentes en ellos. Además, pueden encontrar aplicación en el sector alimentario y biotecnológico, si se consideran prácticas de agroecología, respeto a la soberanía y ética en el tratamiento de recursos filogenéticos.

La importancia de rescatar los saberes tradicionales sobre los cultivos andinos, las técnicas agrícolas tradicionales, la conservación de las especies nativas y sus variedades se han podido preservar debido a la dedicación y al cariño que le han profesado por generaciones las poblaciones indígenas.

En la actualidad, los cultivos andinos que históricamente formaron parte de la dieta de sus poblaciones originarias, son considerados como alimentos de alta calidad. En general están considerados como cultivos rústicos, con resistencia a sequía, helada y salinidad, sin embargo, son escasos los estudios que se han realizado sobre los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja.

Esta investigación tendrá como beneficiarios previstos a las comunidades de los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia Tayacaja.

1.1.4. Objetivos

Objetivo General

- Determinar la taxonomía y características agronómicas de los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú.

Objetivos Específicos

- Determinar la Taxonomía de los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú.
- Determinar las características agronómicas que conforman los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú.

1.1.5. Limitaciones

A continuación, mencionaremos las principales limitaciones para el desarrollo del presente proyecto de investigación formativa:

- Dificultad en la ejecución del proyecto debido al contexto del COVID-19, que estábamos viviendo.
- Dificultad en el acceso a movilidad, para el traslado de los estudiantes para la realización de las encuestas en los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández.
- Limitaciones de orden geográfico y físico natural.
- Falta de presupuesto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, para la ejecución del presente proyecto de investigación formativa.



La investigación, su esencia y arte.



CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La investigación, su esencia y arte.

2.1. Antecedentes del problema

Antecedentes

En las últimas décadas las distintas naciones, organizaciones, hombres y mujeres de la zona andina, están demostrando una tendencia hacia la modernidad sobre los cultivos andinos al impulsar investigaciones relacionados a dichos cultivos, destacando las características botánicas de las primordiales plantas nutritivas de los andes; asimismo diferentes entes nacionales e internacionales establecen un gran empeño en la comprobación sobre la exploración de los cultivos nativos de los Andes, los cuales son subutilizados con respecto a su aporte nutritivo (Mygind et al., 2016; Sáenz, 2019).

La abundancia de la biodiversidad agrícola, se expone a su deterioro; por ende, el tema que siempre se pone en debate es la erosión genética. Por tal motivo el “Informe sobre el Estado de los Recursos Fitogenéticos en el Mundo”, el cual fue elaborado para ser presentado en la Conferencia Técnica Internacional, trató sobre los recursos genéticos de las plantas, llevado a cabo en 1996 en la ciudad de Leipzig, donde menciona “en los países andinos se está registrando una erosión en gran escala de variedades locales de cultivos autóctonos y de plantas silvestres afines de las cultivadas” (Apaza Ahumada, 2019; Clavijo Ponce, 2018).

La disminución de las superficies de cultivo, es a causa de la presión cultural, así como el trabajo de preservación de las especies que es realizada por los agricultores de los andes del Perú, aun no se evidencia daños considerables de erosión genética; sin embargo, se puede incrementar drásticamente en los próximos años, a causa de la presión causada por el mercado mundial (Mygind et al., 2016; Percca Cutipa, 2018).

La poca producción de cultivos andinos, se debe a la fragilidad de los sistemas andinos, por sus características biofísicas, topográficas y edáficas, responsables de la alta vulnerabilidad de los recursos renovables y su posible degradación irreversible, según la intensidad de uso y el tipo de manejo. Los riesgos de erosión al cual las poblaciones originarias habían dado respuestas con la organización del sistema de producción del layme, edificando andenes, uso de chaquitacla para el arado del terreno, entre otras prácticas de manejo, hoy se han agudizado por desconocimiento, a causa del crecimiento de la población que trae como consecuencia el extender las áreas de terreno agrícola, ingreso de tecnología agrícola inadecuada para tipo de terreno y cultivo de la zona andina. Situación similar acontece con los riesgos climáticos, de heladas y sequías, que los campesinos lograban superar organizando la producción y los intercambios dentro del territorio con un articulado control vertical de los pisos

ecológicos, una adaptación constante del calendario agrícola y un ingenioso manejo de la fertilidad y humedad del suelo (Clavijo Ponce, 2018; Ponce & Martínez, 2014).

Otra característica específica de las áreas de montaña y en particular de la región andina del Perú, es la elevada diversidad biológica, cultural, ecológica, siendo el cimiento de la diversidad de los alimentos, establecimiento en su producción, sostenibilidad de los recursos naturales (De la Cruz-Arango et al., 2020; González-Elizondo et al., 2017). Esta variabilidad ha creado, históricamente, la posibilidad en la diversificación en la labor productiva como alimenticia (Adrianzén, 2015; Castillo-Vera et al., 2017).

La superficie agrícola andina es variada, dependiendo de su altura, tipo de suelo, tiempo de horas sol. Por esta razón, los ecosistemas montañosos requieren ser zonificados, permitiendo así examinar dichas diferencias que se dan en áreas pequeñas. Los planos actuales de la ecología del terreno pueden causar confusiones al investigador, debido a la escala que son elaborados, no son observables las variaciones del terreno (Percca Cutipa, 2018; Ponce & Martínez, 2014).

En el Perú hay la presencia de ocho regiones naturales; siendo cinco ubicadas en la sierra o denominada región alto andina, como componentes agronómicos a la clasificación por regiones naturales, la cual está compuesta por zonas ecológicas y agronómicas basadas según lo

empleado por Pulgar Vidal y adicionando el saber del agricultor de la localidad, la relación cercana entre clima, flora natural, los cultivares, los componentes agrícolas del cultivo. Las zonas agrícolas y ecológicas, nos da una claridad de las variaciones presentes en la utilización del terreno, comprendiendo a la misma comunidad y aclarando las desigualdades del rendimiento de los diferentes cultivos de los andes (González-Elizondo et al., 2017; Huamán et al., 2019).

La constitución fisicoquímica y la acción biológica del suelo son elementales en la producción agrícola. Por lo tanto, es imprescindible conservar y aumentar la riqueza de los suelos, evitando la merma de macro y micronutrientes causados por actividades como la compactación, erosión, sales, entre otros (Apaza Ahumada, 2019; Mygind et al., 2016).

A la denominación de Sistema agrícola, se refiere al grupo de componentes tales como el suelo, flora, fauna, clima, la relación existente entre ellos, además de los insumos usados y la producción obtenida a través de las diferentes técnicas aplicadas, siendo la finalidad de lograr alimentos y diferentes funciones (Clavijo Ponce, 2018; Jacobsen, S. E.; Mujica, A.; Ortiz, 2003).

En la región andina, a la superficie destinada a producir un determinado cultivo es denominado “la chacra”; por lo tanto, existirán chacra de quinua, papas u otras.

Además, en los cultivos se distinguen incluso seis sistemas de producción, según la altura en la que se desarrollan, utilización del riego, naturaleza de los suelos, finalidad del rendimiento, incluyendo al rendimiento particular y grupal, como sembrar en terrenos particulares y grupales elevados y cercanos a la vivienda, con cultivos nutritivos; sembrar en terrenos bajos con irrigación, por ejemplo, en la zona Quechua de Cusco; métodos grupales de sembrío de layme realizada en el altiplano de Bolivia y Puno; terrenos comerciales de sembrío de gran amplitud, como las Cooperativas en Perú; además de parcelas con árboles de frutales, ubicadas en la localidad de Cochabamba, región de Cajamarca (Apaza Ahumada, 2019; Huaman Chacaltana et al., 2018; Jacobsen, S. E.; Mujica, A.; Ortiz, 2003).

2.2. Marco teórico

La agricultura de montaña En los Andes Centrales (Ecuador, Perú y Bolivia), la agricultura de montaña se ubica desde los 1 500 hasta más de 4 000 msnm, con presencia de campesinos, sus conocimientos tradicionales y con una alta diversidad de cultivos y alternativas tecnológicas. Esas características en cierta manera la hacen única. Se debe tener en cuenta tanto los aspectos de la topografía del terreno, como los climáticos y los aspectos culturales de la población que los mantiene (Huaman Chacaltana et al., 2018; Mygind et al., 2016; Sáenz, 2019).

El clima está condicionado por heladas y sequía, que son factores importantes en la siembra de cultivos andinos en varios niveles de zonas agroecológicas, en dependencia de la altitud, con bruscas variaciones espaciales por el accidentado relieve. En la zona ubicada en un rango variable, entre los 3100 y los 3800 m.s.n.m., donde escurren las dos microcuencas principales del río Ichu y Cachi y hay área de puquiales y de origen y escurrimiento de dos otras pequeñas microcuencas, la del río Tambos (Huando-Mariscal Cáceres) y del río Uchuyaco (Conayca, Cuenca, Izcuchaca) que llegan en el río Mantaro. Se podrían diferenciar una parte de suni bajo y suni alto, en relación a la altura, la pendiente y la proximidad a las quebradas que determinan la mayor o menor afectación a las heladas, diferencias en la disponibilidad hídrica y en el grado de erosión de suelos (Clavijo Ponce, 2018; Jacobsen, S. E.; Mujica, A.; Ortiz, 2003).

La investigación, su esencia y arte.

La altura óptima se ha definido en base al registro de la mayor frecuencia de cultivo en los Andes de Perú y Bolivia. Esta varía según la latitud, es decir la distancia a la línea ecuatorial; sin embargo, su adaptación a áreas de menor altitud puede extenderse en algunos casos.

Sin embargo, un indicador de adaptación climática es la altura máxima a la cual se puede cultivar y obtener rendimientos aceptables. Este límite está directamente relacionado a la presencia e intensidad de las heladas y

precipitaciones que a su vez dependen de la latitud geográfica (Jacobsen, S. E.; Mujica, A.; Ortiz, 2003; Percca Cutipa, 2018)´.

Dada la extrema variabilidad topográfica en la zona normalmente encontramos a breve distancias cambios bruscos de altitud. Múltiples son los sistemas de producción. Según la altitud, los suelos, las orientaciones económico-productivas familiares se presentan diferentes rotaciones, que aquí ejemplificamos: papa, oca, mashua, olluco, haba, arveja, cebada, barbecho (parte baja del suni), papa, cebada, avena, barbecho (parte media-alta de suni), ajo, maca, barbecho (parte media-alta de suni). También pueden sembrar la avena forrajera, para ganado, o la variedad “Quaker” (importada de los Estados Unidos y introducida en los años 1980) para el consumo humano y venta. Siembran la quinua, pero en menor cantidad porque requiere más trabajo (Mygind et al., 2016; Ponce & Martínez, 2014).

En la región andina la alimentación es un factor estructurante de la realidad social, se describe la estrecha relación que desarrolló el hombre andino con su medio geográfico, y las plantas y animales que domesticó dando lugar a una cultura singular en la que aunó la extraordinaria riqueza nutricional de sus alimentos tradicionales, con un sistema de producción, conservación y distribución de los alimentos que permitió una civilización en la que no se

conoció el hambre. (Apaza Ahumada, 2019; Ponce & Martínez, 2014).

Los Andes es uno de los centros Vavilov de diversidad, donde encontramos 38 especies de plantas domesticadas, pero solamente en Perú existen 25,000 especies, que corresponde a un 10% de las especies de todo el mundo. Entre las domesticadas tenemos tuberosas, raíces, granos, frutas y vegetales, mientras que un gran número de plantas medicinales y ornamentales no están domesticadas todavía. La biodiversidad del altiplano peruano incluye los seres vivos y comprende los biomas terrestres (pisos bioclimáticos) y acuático (lago Titicaca). En estos ambientes, la flora y la fauna han evolucionado genéticamente y se han adaptado a las variaciones climáticas de mayor riesgo a la sobrevivencia. Los pisos bioclimáticos y el lago Titicaca poseen características abióticas y bióticas peculiares, por cuya razón, la diversidad de especies, variabilidad genética, los ecosistemas y la diversidad étnica son componentes básicos en la expresión actual de la diversidad biológica (Castañeda et al., 2019; Mostacero et al., 2017; Viena et al., 2020).

La gran diversidad genética de los cultivos andinos hace que también exista mucha diversidad de formas de procesar estos productos. Existe una variabilidad en formas, colores y tamaños, y ocurren diferencias de calidades y cantidades de metabolitos primarios (almidones, minerales,

proteínas, vitaminas, ácidos grasos, glucósidos, azúcares), y secundarios (saponinas, alcaloides, taninos, oxalatos, carotenos, antocianinas, betacianinas) (Gutiérrez et al., 2019; Mostacero-León et al., 2019; Mostacero et al., 2017; Viena et al., 2020).

Los recursos genéticos de plantas, son la resultante de un proceso evolutivo lento y complejo, donde el agricultor andino ha intervenido en el uso y conservación genética racional de los recursos genéticos en sus diferentes categorías, como familiares rústicos, origen y plantaciones antiguas, líneas avanzadas de mejoramiento genético (Martínez Cruz, 2015; Mostacero et al., 2017; Pérez Alvarez et al., 2015).

Es importante que el material genético para la conservación del germoplasma actual de granos andinos sea orientado inocuidad de los alimentos. En la Estación Experimental Choquenaira, se realizan las actividades de seguimiento y evaluación de granos andinos en las condiciones del Altiplano Norte y Centro con la participación de los agricultores de diferentes municipios. A partir de estos materiales de mejoramiento se lograron liberar seis variedades de quinua con características agronómicas promisorias, principalmente tolerantes al mildiu enfermedad ocasionada por el patógeno *Peronospora efusa*. También, el cultivo de cañahua es otro alternativo a la seguridad alimentaria, en este marco fueron liberadas siete variedades de cañahua con doble

propósito. Estos granos importantes, merecen recibir la atención correspondiente para su sostenibilidad (González et al., 2018; Olascuaga-Castillo et al., 2020; Peralta Gutiérrez & Castañeda Sifuentes, 2017)

En el Perú la diversidad biológica de la biomasa de la Tierra, presenta utilidad en la comparación y competición superiores relacionadas a otros países, además, los granos de *Chenopodium quinoa* Willd, *Chenopodium pallidicaule* Aellen, *Amaranthus caudatus* L., *Lupinus mutabilis* Sweet, presentan excelentes particularidades en el tratamiento de enfermedades alimenticias de la humanidad. Las raíces de *Lepidium meyenii*, presenta cualidad en el uso medicinal, influyendo en la juventud y reproducción de la humanidad, así mismo, p'irka y wachanq'ha presentan cualidades en el uso medicinal desconocidas por el saber humano, aunque, la comunidad de los andes los utiliza como purgante y molestias en el hígado (González-Elizondo et al., 2017; Huamán et al., 2019; Viena et al., 2020).

Siendo la “taxonomía parte de la botánica que, mediante el estudio y el análisis detallados, intentan proporcionar un sistema lógico de clasificación y la nomenclatura necesarias para esas diversas formas de vida vegetal. Al mismo tiempo, la taxonomía busca proporcionar una sólida base científica para las relaciones biológicas que intervienen en cualquier sistema de clasificación que se

proponga. A fin de hacer todo esto, el taxónomo tiene que utilizar de modo efectivo una amplia variedad de datos procedentes de los otros campos especializados de la investigación biológica” (Aponte, 2017; Mostacero-León et al., 2019; Mostacero et al., 2017; Viena et al., 2020).

Las características agronómicas, comprende el manejo agronómico del cultivo, como la elección del terreno, preparación del suelo, tratamiento de la semilla, siembra, deshierbo, riegos, fertilización, manejo de plagas y enfermedades, manejo de cosecha y pos cosecha, asimismo teniendo presente los componentes climáticos de la zona andina (Mygind et al., 2016; Sáenz, 2019). Hay que resaltar que una gran cantidad de productores de granos andinos dedica su producción para el consumo del hogar (autoconsumo) y solo el 32% (45 806 productores) comercializa su producción. Los cultivos que en promedio brindan mayores ingresos por ventas a los productores es la quinua y la kiwicha (con S/ 2 355 y S/. 1 031, respectivamente en toda la campaña agrícola), mientras que los cultivos de cañihua y tarhui grano seco, son lo que generan menos ingresos por ventas a sus productores de S/ 443 y S/ 412, respectivamente (Apaza Ahumada, 2019; Clavijo Ponce, 2018; Huaman Chacaltana et al., 2018).

A nivel productivo, en el año 2017, en el Perú se sembró más de 81 mil ha de granos andinos, de los cuales se cosechó alrededor de 79 mil ha. En cuanto a la producción de granos andinos, se tiene que la producción de quinua fue de 78,7 mil t en grano, procedentes de 18 regiones. La producción de tarhui grano seco fue de 13,7 mil t provenientes de 11 regiones. La producción de cañihua fue de 5 mil t provenientes de 3 regiones. La producción de kiwicha fue de 2,7 mil t provenientes de 6 regiones (Mygind et al., 2016; Ponce & Martínez, 2014).



La investigación, su esencia y arte.



CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación, su esencia y arte.

3.1. Diseño metodológico.

Objeto de Estudio

Cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia Tayacaja y su influencia en el desarrollo y progreso de la región Huancavelica.

Fuente de Datos:

Los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, y la información que se recoja a través de Entrevistas Semi- Estructuradas, realizadas a los distritos antes mencionados.

Criterios de inclusión:

Personas de ambos sexos, mayores de 20 años, que residen en los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja, Huancavelica, Perú.

Lugar de Ejecución

La investigación se realizó a través de recorridos previamente establecidos y que cubrió los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja. Ubicado, desde 12°23'25" hasta los 12°24'16" de Latitud Sur y 74°51'30" hasta los 74°53'29" de longitud Oeste. Ocupando una

extensión de 306.95 Km². Con una altitud promedio de 3279 msnm.


Tipo de estudio

Corresponderá a un estudio Descriptivo.

3.2. Procedimiento de muestreo.

Muestra

Estuvo constituida por un número de personas, pertenecientes a la población antes referida. Para obtener esta cifra se usó la fórmula que considera población finita y varianza desconocida y se calcula de la siguiente forma (Valdivieso Taborga et al., 2011).


$$n = \frac{NZ^2pq}{d^2(N-1) + Z^2pq}$$

Donde:

n: Tamaño de la muestra,

N: Población del estudio N= (INEI).

p: Proporción de éxito de la característica de interés, igual a 50% (0.5).

q: 1 - P = complemento de P.

Z: Coeficiente de confiabilidad al 95% igual a 1.96.

Método de selección de la muestra

Se realizó un muestreo aleatorio del total de habitantes de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, de la Provincia de Tayacaja, a partir del cual se obtuvo el número de muestra; para luego elegir al azar a las personas a entrevistar, muestra que estuvo conformada por personas representativas de los distritos; teniendo en cuenta en todo momento que cumplieran con los criterios de inclusión estipulado en los párrafos anteriores, seguido a ello se le solicitó al azar a una persona para que participe en el estudio.

Finalmente, se procedió a aplicar la entrevista elaborada, marcándose la opción elegida por el entrevistado para cada pregunta.

La i

3.3. Recolección y análisis de la información

Este estudio empleó la técnica de la entrevista. Para ello se elaboró y validó una entrevista Semi estructurada, que consistió en información que abarcará datos generales del(a) entrevistado(a), con preguntas sobre características agronómicas de los cultivos andinos de los distritos de Pampas, Ahuaycha

y Daniel Hernández de la provincia de Tayacaja,
Perú.

Procedimientos de recolección de datos

a. Primero se seleccionó al individuo a entrevistar conforme a lo señalado previamente y luego se le solicitó su participación en el estudio.

b. Con la persona que accedió a participar, se procedió a la entrevista, marcándose la opción elegida por el entrevistado para cada pregunta de la Guía referida en la sección anterior.

3.4. Aspectos éticos y regulatorios.

Durante cada etapa del proyecto en mención, se contó con el consentimiento de las personas voluntarias que participaran en las entrevistas; respetando el derecho a la *La investigación, su esencia y arte.*
privacidad de cada entrevistado.



La investigación, su esencia y arte.

4.1. Resultados finales

Se muestra la taxonomía de cultivos andinos en el distrito de Ahuaycha (Tabla 1), los cultivos de “cebada” *Hordeum vulgare*, “maíz” *Zea mayz* pertenecientes a la familia Poaceae; “habas” *Vicia faba* perteneciente a la familia Fabaceae; “papa” *Solanum tuberosum* perteneciente a la familia Solanaceae y “quinua” *Chenopodium quinoa* perteneciente a la familia Amaranthaceae.

Tabla 1

Taxonomía de los cultivos andinos del distrito Ahuaycha, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020

Cultivos andinos	Nombre científico	Familia
Cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae
Habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae
Maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae
Quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae

Fuente: Elaboración propia.

Se muestra la taxonomía de cultivos andinos en el distrito Daniel Hernández (Tabla 2), los cultivos “quinua” *Chenopodium quinoa* perteneciente a la familia Amaranthaceae; “olluco” *Ullucus tuberosus* perteneciente a la

familia Basellaceae; “zapallo” *Cucurbita máxima* de la familia Cucurbitaceae; “alfalfa” *Medicago sativa*, “frijol” *Phaseolus vulgaris* y “habas” *Vicia faba* perteneciente a la familia Fabaceae”; “oca” *Oxalis tuberosa* perteneciente a la familia Oxalidaceae; “cebada” *Hordeum vulgare*, el “maíz” *Zea mayz*, “trigo” *Triticum sp* pertenecientes a la familia Poaceae y la “papa” *Solanum tuberosum* perteneciente a la familia Solanaceae.

Tabla 2

Taxonomía de los cultivos andinos del distrito Daniel Hernández, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020

Cultivos andinos	Nombre Científico	Familia
Alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceaea
Cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae
Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceaea
Habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea
Maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae
Oca	<i>Oxalis tuberosa</i>	Oxalidaceae
Olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae
Quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae
Trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae
Zapallo	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitaceae

Fuente: Elaboración propia.

Se muestra la taxonomía de cultivos andinos en el distrito Pampas (Tabla 3), los cultivos “zapallo” *Cucurbita máxima* de la familia Cucurbitaceae; “alfalfa” *Medicago sativa* perteneciente a la familia Fabaceae; el “maíz” *Zea mayz*, “trigo” *Triticum sp* pertenecientes a la familia Poaceae y la “papa” *Solanum tuberosum* perteneciente a la familia Solanaceae.

Tabla 3

Taxonomía de los cultivos andinos del distrito Pampas, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020

Cultivo	Nombre Científico	Familia
Alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae
Maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae
Trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae
Zapallo	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitaceae

Fuente: Elaboración propia.

Se logró determinar la taxonomía de los cultivos andinos que se siembran en los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández de la provincia de Tayacaja (Tabla 4), que sirven de alimento para la población. Hallándose 5, 11 y 5 cultivos andinos en el distrito de Ahuaycha, Daniel Hernández y Pampas respectivamente, presentando mayor variedad de cultivos andinos el distrito Daniel Hernández

Tabla 4

Consolidado de la Taxonomía de los cultivos andinos del distrito Pampas, Daniel Hernández y Ahuaycha, provincia de Tayacaja- Huancavelica 2020

Cultivo	Nombre Científico	Familia
Alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae
Cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae
Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceae
Habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae
Maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae
Oca	<i>Oxalis tuberosa</i>	Oxalidaceae
Olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae
Quinoa	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae
Trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae
Zapallo	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitaceae

La investigación, su esencia y arte.
 Fuente: Elaboración propia.

En el Distrito de Ahuaycha, el cultivo que obtuvo el mayor rendimiento promedio fue la papa con 16.69 ton/ha (Tabla 5), siendo la papa la variedad yungay que obtuvo un mayor rendimiento con 30.00 ton/ha; asimismo, la papa variedad camotillo presentó el menor rendimiento con 8.00 ton/ha; sin embargo, la cebada variedad blanca, es el cultivo que presentó el menor rendimiento promedio con 1.00 ton/ha.

Tabla 5

Cultivos Andinos del distrito Ahuaycha, variedad, rendimiento promedio de cada variedad y por cultivo, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020.

Cultivo	Variedad	Rendimiento promedio de cada variedad (tn/ha)	Rendimiento promedio de cada cultivo (tn/ha)
Alverja	Americana	7.00	7.00
	Blanca	7.00	
Cebada	Blanca	1.00	1.00
Habas	Bellite	7.00	6.00
	Verde	5.00	
Maíz	Antahuaray	3.46	3.44
	Astilla	1.44	
	Blanca	3.96	
	Carhuay	5.20	
	Color	1.60	
	Estaquilla	5.00	
Papa	Amarilis	20.00	16.69
	Blanca	14.67	
	Camotillo	8.00	
	Canchan	12.50	
	Peruanita	15.00	
	Yungay	30.00	
Quinua	Blanca	3.47	5.86
	Hualhuas	7.00	
	Roja	7.10	

Fuente: Elaboración propia.

En el Distrito Daniel Hernández, el cultivo que obtuvo mayor rendimiento promedio fue la alfalfa variedad ino y la variedad trébol con 20.00 ton/ha (Tabla 6); sin embargo, el olluco obtuvo el menor rendimiento promedio con 1.29 ton/ha, siendo el olluco variedad chispa que presentó un mayor rendimiento con 1.78 ton/ha. y el olluco variedad canario, variedad crispa amarilla y crispa rosada con 1.00 ton/ha respectivamente.

Tabla 6

Cultivos Andinos del distrito Daniel Hernández, variedad, rendimiento promedio de cada variedad y por cultivo, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020.

Cultivo	Variedad	Rendimiento promedio de cada variedad (tn/ha)	Rendimiento promedio de cada cultivo (tn/ha)
Alfalfa	Ino	20.00	20.00
	Trebol	20.00	
	Alderman	4.90	
	Amarillo	8.00	
	Americana	3.84	
	Blanca	4.75	
Alverja	Cuantium	7.20	6.08
	Herli	7.20	
	Importado	5.45	
	Osoy	7.20	
	Remate	3.37	

	Remate	8.00	
	Usoy	7.00	
	1.96	1.00	
Cebada	Blanca	5.50	2.13
	Cervecera	1.00	
	Cevicera	1.00	
Frijol	Caballero	2.40	2.40
	Corbata	2.40	
Habas	Amarillo	4.56	4.55
	Bellite	1.60	
	Blanca	6.00	
	Gergona	5.30	
	Verde	5.30	
Maíz	Amarillo	1.91	2.53
	Antahuaray	1.68	
	Astilla	1.37	
	Astilla Blanca	5.20	
	Blanca	2.09	
	Blanca Castilla	4.00	
	Carhuay	2.05	
	Chispa	1.00	
	Estaquilla	1.50	
	Lazio	4.00	
Oca	Redondo	3.00	2.00
	Amarilla	2.00	
	Roja	2.00	
Olluco	Amarillo	1.66	1.29
	Canario	1.00	
	Chispa	1.78	
	Crispa Amarilla	1.00	
	Crispa Rosada	1.00	

La inversión, su esencia y arte.

	Amarilis	23.33	
	Amarilla	18.00	
	Andina	17.20	
	Blanca	18.26	
	Camotillo	18.00	
Papa	Canchan	18.00	19.10
	Huamantacaguna	18.00	
	Huayro	13.94	
	Perricholi	26.00	
	Peruanita	22.75	
	Tumbay	20.00	
	Yungay	15.69	
Quinoa	Blanca	1.60	2.05
	Roja	2.50	
Trigo	Barba Negra	1.50	1.57
	Santa Rosa	1.64	
Zapallo	Macre	10.00	10.00

Fuente: Elaboración propia.

En el distrito Pampas, el cultivo que obtuvo mayor rendimiento promedio fue la alfalfa variedad trébol con 20.00 ton/ha y el trigo variedad normal presentó el menor rendimiento promedio con 1.66 ton/ha (Tabla 7).

Tabla 7

Cultivos Andinos del distrito Pampas, variedad, rendimiento promedio de cada variedad y por cultivo, provincia Tayacaja-Huancavelica 2020.

Cultivo	Variedad	Rendimiento promedio de cada variedad (tn/ha)	Rendimiento promedio de cada cultivo (tn/ha)
Alfalfa	Trebol	20.00	20.00
	Antahuaray	5.40	
Maíz	Astilla	1.60	4.18
	Blanca	5.20	
	Dorado	4.50	
Papa	Blanca	4.50	4.50
	Peruanita	4.50	
Trigo	Normal	1.60	1.60
Zapallo	Macre	10.00	10.00

Fuente: Elaboración propia.

La investigación, su esencia y arte.

En los distritos Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, la alfalfa la que obtuvo el mayor rendimiento promedio con 20.00 ton/ha y el olluco presentó el menor rendimiento promedio con 1.30 ton/ha (Tabla 8).

Tabla 8

Rendimiento promedio consolidado de los cultivos andinos de los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández de la provincia Tayacaja- Huancavelica 2020.


Cultivo	Rendimiento promedio de cada cultivo (tn/ha)
Alfalfa	20.00
Alverja	4.90
Cebada	2.50
Frijol	2.40
Habas	5.02
Maíz	2.43
Oca	2.00
Olluco	1.30
Papa	17.49
Quinua	4.24
Trigo	1.61
Zapallo	10.00

Fuente: Elaboración propia.

Temperatura máxima y mínima promedio de los distritos Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020 fueron de 16°C y 4°C respectivamente (Figura 1).

Figura 1

Temperatura máxima y mínima promedio de los distritos Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020.




Fuente: <https://es.weatherspark.com/>
La investigación, su esencia y arte.

Precipitación de lluvia mensual promedio máxima y mínima de los Distritos Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020, fue 65 mm y 3 mm respectivamente (figura 2).

Figura 2

Precipitación de lluvia mensual promedio de los distritos Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, provincia Tayacaja- Huancavelica 2020.




Fuente: <https://es.weatherspark.com/>

Tiempo que se pasa en diferentes bandas de temperatura y el período de cultivo de los distritos Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, provincia de Tayacaja-Huancavelica 2020, mostrando el momento propicio para los períodos de siembra de cultivos andinos en los meses de setiembre a mayo 2020 (Figura 3).

Figura 3

Tiempo que se pasa en diferentes bandas de temperatura y el período de cultivo de los Distritos de Ahuaycha, Pampas y Daniel Hernández, Provincia de Tayacaja- Huancavelica 2020.



Fuente: <https://es.weatherspark.com/>

La investigación, su esencia y arte.



UNAT

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


La investigación, su esencia y arte.

5.1. Conclusiones

- Se identificaron las especies de los cultivos andinos de los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, provincia Tayacaja, donde se mostró mayor variedad de cultivos andinos en el distrito Daniel Hernández, y menor variedad de cultivos andinos en los distritos Pampas y Ahuaycha.
- Siendo el “maíz” *Zea mays* y la “papa” *Solanum tuberosum*, los cultivos andinos que se siembran en los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández.
- El bajo rendimiento de los cultivos andinos, es causada por la fragilidad de los sistemas andinos, como sus características biofísicas, topográficas, edáficas, siendo la principal causa el factor climático a causa de las precipitaciones, heladas y sequías, en especial la altura máxima en la cual se puede sembrar y obtener rendimientos aceptables.
- En los distritos Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, la alfalfa *Medicago sativa* es la que obtuvo el mayor rendimiento promedio 20.00 ton/ha y el olluco *Ullucus tuberosus* presentó el menor rendimiento promedio 1.30 ton/ha.

5.2. Recomendaciones

- Siendo la falta de presupuesto para el presente Proyecto de Investigación Formativa por la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo, un factor muy importante para su ejecución, se sugiere asignar presupuesto para los próximos Proyecto de Investigaciones Formativas.
- Mejorar las condiciones para el desarrollo de cultivos andinos, como reservorios, semillas certificadas, personal calificado, ambientes adecuados para el almacenamiento de la cosecha, manejo integrado de plagas y enfermedades, reducir el uso de agroquímicos, como pesticidas, impulsar la agricultura orgánica, entre otros.



La investigación, su esencia y arte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adrianzén, M. U. (2015). Aboveground biomass input of myristicaceae tree species in the amazonian forest in Perú. *Revista de Biología Tropical*, 63(1), 263–274. <https://doi.org/10.15517/rbt.v63i1.14254>
- Apaza Ahumada, M. G. (2019). Efecto del consumo de cultivos andinos quinua, cañihua y tarwi sobre el incremento de peso y nitrógeno retenido en ratas wistar. *Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research*, 21(3), 194–204. <https://doi.org/10.18271/ria.2019.477>
- Aponte, H. (2017). *Sobre la necesidad de una actualización taxonómica*. 34(4), 752–753. <https://doi.org/10.1128/JCM.01646-10.4>.
- Castañeda, R., Gutiérrez, H., Chávez, G., & Villanueva, R. (2019). Etnobotánica de las flores de la pasión (Passiflora) en la provincia andina de Angaraes (Huancavelica, Perú). *Boletín Latinoamericano Y Del Caribe De Plantas Medicinales Y Aromáticas*, 8(1), 27–41. <http://revistas.usach.cl/ojs/index.php/blacpma/article/view/3848>
- Castillo-Vera, H., Cochachin, E., & Albán, J. (2017). Plantas comercializadas por herbolarios en el mercado del distrito de cajabamba (Cajamarca, Perú). *Boletín Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas*, 16(3), 303–318.

<https://www.redalyc.org/pdf/856/85650470005.pdf>

Clavijo Ponce, N. L. (2018). Cultura y conservación in situ de tubérculos andinos marginados en agroecosistemas de Boyacá: un análisis de su persistencia desde la época prehispánica hasta el año 2016. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 14(80). <https://doi.org/10.11144/javeriana.cdr14-80.ccst>

De la Cruz-Arango, J., Gómez-Carrión, J., Chanco-Estela, M., Carrillo-Fuentes, E. P., & Aucasime-Medina, L. (2020). Flora y vegetación de la provincia de Huamanga (Ayacucho-Perú). *Journal of the Selva Andina Biosphere*, 8(1), 3–18. <https://doi.org/10.36610/j.jsab.2020.080100003>

Gonzáles, P., León, B., Cano, A., & Jørgensen, P. M. (2018). Vascular flora and phytogeographical links of the Carabaya Mountains, Peru. *Revista Peruana de Biología*, 25(3), 191–210. <https://doi.org/10.15381/rpb.v25i3.15228>

González-Elizondo, M. S., González-Elizondo, M., López-Enríquez, I. L., Tena-Flores, J. A., Gonzálezgallegos, J. G., Ruacho-González, L., Melgoza-Castillo, A., Villarreal-Quintanilla, J. Á., & Estrada-Castillón, A. E. (2017). Diagnóstico del conocimiento taxonómico y florístico de las plantas vasculares del norte de México. *Botanical Sciences*, 95(4), 760–779. <https://doi.org/10.17129/botsci.1865>

Gutiérrez, H., Castañeda, R., & Nauray, W. (2019). *Epidendrum suinii*

(Orchidaceae: Epidendroideae) a new record for peruvian flora.
Revista Peruana de Biología, 26(2), 271–274.
<https://doi.org/10.15381/rpb.v26i2.15142>

Huaman Chacaltana, M. hetel, Licapa Quichca, Y., & Mendoza Peña, S. J. (2018). *EFFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL DE LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA DE MADRES SOBRE EL USO DE LOS GRANOS ANDINOS EN EL DISTRITO DE CALLAHUANCA – HUAROCHIRÍ – 2017* [Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta].
<http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1254/TESES DE GRANOS ANDINOS 2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Huamán, L., Albán, J., & Chilquillo, E. (2019). ASPECTOS TAXONÓMICOS Y AVANCES EN EL CONOCIMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DEL ÁRBOL DE LA QUINA (*Cinchona officinalis* L.) EN EL NORTE DE PERÚ. *Ecología Aplicada*, 18(2), 145. <https://doi.org/10.21704/rea.v18i2.1333>

Jacobsen, S. E.; Mujica, A.; Ortiz, R. (2003). La importancia de los cultivos andinos. *Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, 13(36), 14–24.
<https://www.redalyc.org/pdf/705/70503603.pdf>


Martínez Cruz, M. (2015). Revisión bibliográfica *Stevia rebaudiana* (Bert.) Bertoni. Una revisión. *Cultivos Tropicales*, 36, 5–15.

<https://ediciones.inca.edu.cu>

- Mostacero-León, J., Peláez-Peláez, F., Alarcón-Rojas, N. M., De La Cruz-Castillo, A. J., Alva-Calderón, R., & Charcape-Ravelo, M. (2019). Plantas utilizadas para el tratamiento del cáncer expendidas en los principales mercados de la provincia de Trujillo, Perú, 2016 – 2017. *Boletín Latinoamericano y Del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas*, 18(1), 81–94. <https://doi.org/10.35588/blacpma.19.18.1.07>
- Mostacero, J., Mejía, F., Gastañadui, D., & De La Cruz, J. (2017). Inventario taxonómico, fitogeográfico y etnobotánico de frutales nativos del norte del Perú. *Scientia Agropecuaria*, 8(3), 215–224. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2017.03.04>
- Mygind, T. P., Mercado, G., & Aruquipa, R. (2016). Un nuevo rol - la revalorización de los cultivos andinos nativos en los medios de subsistencia de los agricultores bolivianos. *Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales*, 3(2), 179–187. http://www.scielo.org.bo/pdf/riiarn/v3n2/v3n2_a07.pdf
- Olascuaga-Castillo, K., Rubio-Guevara, S., Blanco-Olano, C., & Valdiviezo-Campos, J. E. (2020). *Desmodium molliculum* (Kunth) DC (Fabaceae); perfil etnobotánico, fitoquímico y farmacológico de una planta andina peruana. *Ethnobotany Research and Applications*, 19, 1–13. <https://doi.org/10.32859/era.19.19.1-13>

- Peralta Gutiérrez, H., & Castañeda Sifuentes, R. (2017). Catálogo De Las Gramíneas (Poaceae) De Huancavelica, Perú. *Ecología Aplicada*, 16(1), 63–73. <http://www.scielo.org.pe/pdf/ecol/v16n1/a08v16n1.pdf>
- Percca Cutipa, M. L. (2018). CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA Y MORFOLÓGICA DE DOCE ACCESIONES DE MAIZ (*Zea mays* L.) ALTIPLANICO TOLERANTES AL FRIO EN CIP CAMACANI, PUNO [UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO]. In *Factores Que Influyen En El Inicio De Relaciones Sexuales En Los Adolescentes De La Institución Educativa Secundaria Independencia Nacional Puno*, 2017. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/4842>
- Pérez Alvarez, S., Ávila Quezad, G., & Coto Arbelo, O. (2015). EL AGUACATERO (*Persea americana* Mill) Review Avocado (*Persea americana* Mill). *Cultivos Tropicales*, 36(In Line), 111–123. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193239249016>
- Ponce, N. L. C., & Martínez, M. E. P. (2014). Tubérculos andinos y conocimiento agrícola local en comunidades rurales de Ecuador y Colombia. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 11(74), 149–166. <https://doi.org/10.11144/javeriana.CRD11-74.taca>
- Sáenz, S. (2019). Hay mucho que investigar en las raíces y tubérculos andinos. *Revista de Medicina Veterinaria*, 1(38), 1–9. <https://doi.org/10.19052/mv.vol1.iss38.1>

- Valdivieso Taborga, C. E., Valdivieso Castellón, R., & Valdivieso Taborga, O. Á. (2011). Determinación Del Tamaño Muestral Mediante El Uso De Árboles De Decisión Sample Size Determination Using Decision Trees. *Investigacion & Desarrollo*, 11(1), 53–80. <https://doi.org/10.23881/idupbo.011.1-4e>
- Viena, L. R., León, J. M., Medina, E. L., De La Cruz Castillo, A. J., & Rivero, A. E. G. (2020). Ethnobotanical aspects of Cuspon, Peru: A peasant community that uses 57 species of plants in its various needs. *Scientia Agropecuaria*, 11(1), 7–14. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2020.01.01>



La investigación, su esencia y arte.

ANEXOS

Figura 4

Mapa Político de la Provincia de Tayacaja




La investigación, su esencia y arte.
Fuente: Municipalidad Provincial de Tayacaja

Tabla 9

Distritos de Tayacaja, según superficie, altitud media, ubicación geográfica y población censada 2017

N°	Distrito	Superficie (Km2)	Ubicación Geográfica			Población (Habitantes)
			Altitud (m.s.n.m.)	Latitud Sur	Longitud Oeste	
1	Pampas	109.07	3276	12°23'42''	74°52'02''	9,335
3	Ahuaycha	90.96	3280	12°24'16''	74°53'29''	5,619
4	Daniel Hernández	106.92	3280	12°23'25''	74°51'30''	10,381
Total/ Promedio		306.95	3279			25,335

Fuente: INEI, GUIA ESTADÍSTICA, 2017



La investigación, su esencia y arte.

Tabla 10

Base de datos de la información recabada de los distritos de Pampas, Ahuaycha y Daniel Hernández, Tayacaja, Huancavelica

Distrito	Cultivo	Nombre Científico	Familia	Variedad	Área (ha)	Rend. (tn/ha)
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.40
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Color	0.50	1.60
AHUAYCHA	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae	Verde	1.00	3.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	blanca	1.00	7.50
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Antahuaray	0.50	1.50
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Astilla	0.50	1.44
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	2.00	15.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	0.50	14.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Canchan	1.00	15.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	blanca	1.00	2.80
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Antahuaray	0.50	5.00

La investigación, su esencia y arte.

AHUAYCHA	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae	blanca	0.50	7.20
AHUAYCHA	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae	Roja	0.50	7.00
AHUAYCHA	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae	Americana	0.50	7.00
AHUAYCHA	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceae	blanca	0.50	7.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	blanca	1.00	5.20
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	5.20
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilis	2.00	20.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	2.00	40.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	blanca	0.50	3.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	Antahuaray	0.50	3.00
AHUAYCHA	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae	blanca	0.50	1.60
AHUAYCHA	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae	blanca	0.50	1.60
AHUAYCHA	cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.00
AHUAYCHA	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae	verde	0.50	7.00
AHUAYCHA	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceae	bellite	1.00	7.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mays</i>	Poaceae	blanca	1.00	2.80

La investigación, su esencia y arte.

AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Antahuaray	0.50	2.80
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	0.50	20.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	1.00	20.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	1.00	20.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	10.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	0.50	10.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	canchan	2.00	10.00
AHUAYCHA	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	camotillo	1.00	8.00
AHUAYCHA	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae	roja	0.50	7.20
AHUAYCHA	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthaceae	hualhuas	0.50	7.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Antahuaray	1.00	5.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	5.00
AHUAYCHA	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	estaquilla	0.50	5.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	1.20

La investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Remate	1.00	0.92
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	alderman	1.00	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.10
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	Chispa	1.00	1.78
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	amarillo	1.00	2.11
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	0.50	5.60
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.25	5.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	4.70
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	4.90

DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	2.00	2.10
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.10
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	0.50	3.30
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	2.00	2.70
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	2.00	2.50
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	2.00	2.10
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.33
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	2.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	0.50	1.70
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	0.50	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	30.80

DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	0.25	2.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	0.50	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.17
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Chispa	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	16.92
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Andina	1.00	17.20
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Huayro	0.25	23.32
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	blanca	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	2.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.50	1.22
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	2.00	10.77

DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	1.00	0.77
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	0.77
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yingay	1.00	4.62
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	1.00	0.77
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yingay	1.00	5.60
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.27
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yingay	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	2.00	2.10
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	1.00	1.10
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yingay	0.50	17.78
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	amarillo	1.00	1.27

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.33
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	2.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.10
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	zungay	1.00	2.72
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Huayro	0.50	2.44
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	1.10
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	amarillo	1.00	1.57
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	1.00	2.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Remate	0.50	0.92
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla Blanca	2.00	5.20
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	1.00	5.20
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	zungay	3.00	6.00

DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilis	1.00	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Remate	0.50	4.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	alderman	0.50	4.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	2.60
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilla	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	blanca	0.50	4.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	0.50	4.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	2.00	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilla	0.50	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Canchan	0.50	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Perricholi	0.50	18.00

DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Camotillo	0.50	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Huamantacaguna	0.50	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	Verde	1.00	3.40
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	gergona	1.00	3.40
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Amarillo	1.00	8.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Remate	1.00	8.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	1.00	8.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	1.00	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Estaquilla	1.00	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	amarillo	1.00	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Importado	0.50	7.50

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	amarillo	0.50	6.00
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	blanca	0.50	6.00
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	Verde	0.50	6.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Carhuay	0.50	9.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yingay	1.00	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yingay	0.50	16.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	0.50	16.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilla	0.50	16.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	8.00
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	Verde	0.50	6.80
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	amarillo	0.50	6.80

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	0.50	7.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	blanca	0.50	7.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	2.00	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Antahuaray	2.00	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	Cervecera	3.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	Santa Rosa	0.50	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	Barba Negra	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	amarillo	0.50	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	Verde	1.00	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Astilla	0.50	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthac eae	blanca	0.50	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Antahuaray	1.00	1.20

DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Estaquilla	1.00	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	6.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	2.00	15.00
DANIEL HERNÁNDEZ	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthac eae	Roja	1.00	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceaea	Trebol	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceaea	Ino	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Perricholi	0.50	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilis	0.50	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.80
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	Verde	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	amarillo	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	0.50	7.00

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	blanca	0.50	7.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	CARHUAY	0.50	0.87
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	2.00	1.33
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	CARHUAY	2.00	0.83
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	12.66
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	1.00	11.66
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	2.00	1.33
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	HUAYRO	1.00	13.33
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	10.00
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	ZANAHORIA	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	AMARILLO	0.50	1.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	1.00	0.67

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	REMATE	1.00	0.60
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	CARHUAY	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.17
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	10.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	1.47
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	HUAYRO	1.00	16.66
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	1.00	16.66
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	REMATE	1.00	0.67
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	Americana	1.00	0.83
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	CARHUAY	1.00	0.67
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	0.83
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	18.00

DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	0.50	18.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	2.60
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Antahuaray	0.50	1.30
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	remate	0.50	7.00
DANIEL HERNÁNDEZ	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	Santa Rosa	0.50	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	1.00	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	astilla	0.50	3.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	amarillo	1.00	3.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	Antahuaray	1.00	3.00
DANIEL HERNÁNDEZ	cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	cevicera	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	Santa Rosa	0.50	1.50

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	0.50	15.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	15.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	bellite	0.50	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	amarillo	0.50	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	remate	1.00	7.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	usoy	0.50	7.00
DANIEL HERNÁNDEZ	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	Santa Rosa	1.00	1.60
DANIEL HERNÁNDEZ	cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	blanca	1.00	10.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	10.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	5.00
DANIEL HERNÁNDEZ	quinua	<i>Chenopodium quinoa</i>	Amaranthac eae	roja	0.50	3.40
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	verde	0.50	3.40

Investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	importado	0.50	3.40
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	3.00	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	1.00	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	verde	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	herli	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	alderman	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	cuantum	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	cebada	<i>Hordeum vulgare</i>	Poaceae	1.96	1.00	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	canario	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	crispa amarilla	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	olluco	<i>Ullucus tuberosus</i>	Basellaceae	crispa rosada	0.50	1.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	2.00	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	2.00	30.00

... investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	verde	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	cuantium	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	alderman	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	1.00	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	Perricholi	0.50	30.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	1.00	1.50
DANIEL HERNÁNDEZ	oca	<i>Oxalis tuberosa</i>	Oxalidaceae	roja	1.00	2.00
DANIEL HERNÁNDEZ	oca	<i>Oxalis tuberosa</i>	Oxalidaceae	amarilla	0.50	2.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	lazio	2.00	4.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	redondo	1.00	3.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	amarilis	0.50	20.00

... investigación, su esencia y arte.

DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	tumbay	0.50	20.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	remate	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	osoy	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	habas	<i>Vicia faba</i>	Fabaceaea	gergona	0.50	7.20
DANIEL HERNÁNDEZ	zapallo	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitacea e	macre	0.50	10.00
DANIEL HERNÁNDEZ	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca castilla	4.00	4.00
DANIEL HERNÁNDEZ	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	yungay	0.50	6.00
DANIEL HERNÁNDEZ	frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceaea	caballero	0.13	2.40
DANIEL HERNÁNDEZ	frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fabaceaea	corbata	0.13	2.40
DANIEL HERNÁNDEZ	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	Santa Rosa	0.50	2.00
DANIEL HERNÁNDEZ	arverja	<i>Pisum sativum</i>	Fabaceaea	remate	0.50	2.00
PAMPAS	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	antahuaray	1.00	5.40
PAMPAS	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	blanca	1.00	4.50

La investigación, su esencia y arte.

PAMPAS	papa	<i>Solanum tuberosum</i>	Solanaceae	peruanita	1.00	4.50
PAMPAS	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.80	5.00
PAMPAS	alfalfa	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceaea	Trebol	0.50	20.00
PAMPAS	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	dorado	2.00	4.50
PAMPAS	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	blanca	0.50	5.40
PAMPAS	zapallo	<i>Cucurbita maxima</i>	Cucurbitacea e	macre	2.00	10.00
PAMPAS	maíz	<i>Zea mayz</i>	Poaceae	astilla	0.50	1.60
PAMPAS	trigo	<i>Triticum sp</i>	Poaceae	normal	0.24	1.60



La investigación, su esencia y arte.